(ID　0　) ☆7

治療計画書

療法名　dose dense EC（エピルビシン+シクロホスファミド）　療法　1サイクル　2　週

疾患名　進行乳癌

注射 / 内服 / 放射線	Rp	商品名 / 照射部位	用量(/回) / 用量(/日) / 照射量	投与ルート / 用法	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
						1							2							3							4						
注射	1	生理食塩液	20 ml	CVCポート	ルートキープ	●														●													
注射	2	アロキシ	0.75 mg	点滴	30分	●														●													
		デキサート	9.9 mg																														
		生理食塩液	50 ml																														
注射	3	エピルビシン	90 mg/㎡	点滴(側管)	15分	●														●													
		生理食塩液	50 ml																														
注射	4	エンドキサン	600 mg/㎡	点滴(側管)	30分	●														●													
		生理食塩液	100 ml																														
注射	5	生理食塩液	50 ml	点滴	15分	●														●													
注射	6	ヘパリンNaロックシリンジ	100 IU	CVCポート		●														●													
注射	7	ジーラスタ	3.6 mg	皮下注			●														●												
注射	8																																
注射	9																																
注射	10																																
内服	1	アプレピタント	125 mg	抗癌剤の1時間-1時間半前		●														●													
内服	2	アプレピタント	80 mg	1日1回朝食後			●	●													●	●											
内服	3	ナウゼリン	30 mg	1日3回毎食前			●	●	●	●	●	●	●								●	●	●	●	●	●	●						
内服	4	デカドロン	8 mg	1日1(-2)回朝(昼)食後			●	●	●	(●)											●	●	●	(●)									
内服	5	センノサイド	24 mg	1日1回寝る前			●	●	●												●	●	●										
内服	6																																
内服	7																																
内服	8																																
内服	9																																
内服	10																																
放射線			Gy																														

特記事項

減量規定

薬品名					
標準投与量					
1段階減量					
2段階減量					
3段階減量					