治療計画書

療法名 SOX+オプジーボ 療法 1サイクル 3 週

疾患名 治癒切除不能な進行・再発の胃癌(オプジーボ最長2年間)

注射	Rp	商品名	用量(/回)	投与ルート	投与時間	1							2							3							4						
内服			用量(/日)	用法		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
放射線		照射部位	照射量																														
注射	1	生理食塩液	50 ml	点滴	15分	●																											
注射	2	オプジーボ	360 mg/body	点滴	30分	●																											
		生理食塩液	50 ml																														
注射	3	生理食塩液	50 ml	点滴	15分	●																											
注射	4	グラニセトロン	3 mg	点滴	30分	●																											
		デキサート	6.6 mg																														
注射	5	エルプラット	130 mg/㎡	点滴	2時間	●																											
		5%糖液	250 ml																														
注射	6	生理食塩液	50 ml	点滴	15分	●																											
注射	7																																
注射	8																																
注射	9																																
注射	10																																
内服	1	S-1※	80 mg/㎡	1日2回朝夕食後		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●														
内服	2	デカドロン	8 mg	1日1(-2)回朝(昼)食後			●	●																									
内服	3																																
内服	4																																
内服	5																																
内服	6																																
内服	7																																
内服	8																																
内服	9																																
内服	10																																
放射線			Gy																														

特記事項

エルプラット総投与量が600mg/㎡を超えた場合、エルプラットは担当医の判断で適宜休止して次のサイクルを開始する。
制吐剤としてデカドロン錠を適宜追加する(day2～8mgを2(～3)日)。 ※1日目の夕食後より服用開始。
インラインフィルター(0.2又は0.22μm)を使用すること。

減量規定

薬品名	エルプラット	S-1(1.25㎡未満)	S-1(1.25㎡以上1.50㎡未満)	S-1(1.50㎡以上)	オプジーボ
標準投与量	130 mg/㎡	80 mg/day	100 mg/day	120 mg/day	360 mg
1段階減量	100 mg/㎡	60 mg/day	80 mg/day	100 mg/day	減量なし
2段階減量	75 mg/㎡	50 mg/day	60 mg/day	80 mg/day	
3段階減量					