治療計画書

療法名　イリノテカン＋サイラムザ　療法　1サイクル 2 週

疾患名　治癒切除不能な進行・再発の胃癌

注射/内服/放射線	Rp	商品名	用量(/回)	投与ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
			用量(/日)	用法																													
		照射部位	照射量																														
注射	1	グラニセトロン	3 mg	点滴	30分	●														●													
		デキサート	6.6 mg																														
注射	2	生理食塩液	50 ml	点滴	15分	●														●													
注射	3	サイラムザ	8 mg/kg	点滴	※1時間	●														●													
		生理食塩液	250 ml																														
注射	4	生理食塩液	50 ml	点滴	15分	●														●													
注射	5	トポテシン	150 mg/㎡	点滴	2時間	●														●													
		生理食塩液	500 ml																														
注射	6	生理食塩液	50 ml	点滴	15分	●														●													
注射	7																																
注射	8																																
注射	9																																
注射	10																																
内服	1	レスタミン	50 mg	抗癌剤投与30分前		●														●													
内服	2	半夏瀉心湯	7.5 g	1日3回食間/食前		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
内服	3	ウルソ	300 mg	1日3回食後		●	●	●												●	●	●											
内服	4	メトクロプラミド	15 mg	1日3回食前		●	●	●												●	●	●											
内服	5	重曹	3 g	1日3回食間		●	●	●												●	●	●											
内服	6	酸化マグネシウム/マグラックス	1.2-1.8 g	1日3回食後		●	●	●												●	●	●											
内服	7	デカドロン	8 mg	1日1回朝食後			●	●													●	●											
内服	8																																
内服	9																																
内服	10																																
放射線			Gy																														

特記事項

※G1または2のinfusion reactionが発現した場合は2時間になるよう減速し、その後の投与においても減速した速度で投与する。
（infusion reactionが発現した場合の対応については添付文書参照）

減量規定

薬品名					
標準投与量					
1段階減量					
2段階減量					
3段階減量					