治療計画書

療法名　シタラビン+マイトマイシンC膀胱内注入　療法　1サイクル ※2 週

疾患名　膀胱がん

注射/内服/放射線	Rp	商品名 / 照射部位	用量(/回) / 用量(/日) / 照射量	投与ルート / 用法	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
						1							2							3							4						
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
注射	1	キロサイド	200 mg	膀注		●														(●)													
		マイトマイシン	10 mg	注射用水で溶解																													
		生理食塩液	5 ml	全量40mlに調製																													
注射	2																																
注射	3																																
注射	4																																
注射	5																																
注射	6																																
注射	7																																
注射	8																																
注射	9																																
注射	10																																
内服	1																																
内服	2																																
内服	3																																
内服	4																																
内服	5																																
内服	6																																
内服	7																																
内服	8																																
内服	9																																
内服	10																																
放射線			Gy																														

特記事項

※1サイクルの日数は適宜増減あり(1～4週)
初回TUR-BT後24時間以内に投与。

減量規定

薬品名					
標準投与量					
1段階減量					
2段階減量					
3段階減量					