治療計画書

療法名　キイトルーダ（3週毎）+レンビマ　療法　1サイクル 3 週

疾患名　がん化学療法後に増悪した切除不能な進行・再発の子宮体癌（キイトルーダ：最長2年間）

注射		商品名	用量(/回)	投与ルート	投与時間	1							2							3							4						
内服	Rp		用量(/日)	用法		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
放射線		照射部位	照射量																													
注射	1	生理食塩液	50 ml	点滴	15分	●																										
注射	2	キイトルーダ 生理食塩液	200 mg/body 100 ml	点滴	30分	●																										
注射	3	生理食塩液	50 ml	点滴	15分	●																										
注射	4																															
注射	5																															
注射	6																															
注射	7																															
注射	8																															
注射	9																															
注射	10																															
内服	1	レンビマ	20 mg	1日1回		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
内服	2																															
内服	3																															
内服	4																															
内服	5																															
内服	6																															
内服	7																															
内服	8																															
内服	9																															
放射線			Gy																													

特記事項

インラインフィルター（0.2～5μm）を使用すること。
レンビマ1日1回連日投与

減量規定

薬品名	レンビマ				
標準投与量	20 mg				
1段階減量	14 mg				
2段階減量	10 mg				
3段階減量	8 mg				
4段階減量	4 mg				