

治療計画書

療法名

キイトルーダ(6週毎)+レンビマ

療法

1サイクル 6 週

疾患名 がん化学療法後に増悪した切除不能な進行・再発の子宮体癌(キイトルーダ:最長2年間)

| 注射 内服 放射線 | Rp | 商品名 | 用量(回) | 投与ルート | 投与時間 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----|--------|-------------|-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| | | | 用量(日) | 用法 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 放射線 | | 照射部位 | 照射量 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注射 | | 生理食塩液 | 50 ml | 点滴 | 15分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注射 | 1 | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注射 | | キイトルーダ | 400 mg/body | 点滴 | 30分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注射 | 2 | 生理食塩液 | 100 ml | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注射 | | 生理食塩液 | 50 ml | 点滴 | 15分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注射 | 3 | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注射 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注射 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注射 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注射 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注射 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注射 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注射 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 内服 | 1 | レンビマ | 20 mg | 1日1回 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 内服 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 内服 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 内服 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 内服 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 内服 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 内服 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 内服 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 内服 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 放射線 | | | Gy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

特記事項

インラインフィルター(0.2~5μm)を使用すること。
レンビマ1日1回連日投与

減量規定

| 薬品名 | レンビマ | | | |
|-------|-------|--|--|--|
| 標準投与量 | 20 mg | | | |
| 1段階減量 | 14 mg | | | |
| 2段階減量 | 10 mg | | | |
| 3段階減量 | 8 mg | | | |
| 4段階減量 | 4 mg | | | |