

治療計画書

療法名

mLSG15+ポテリジオ(1コース目)

療法

1サイクル 4 週

疾患名 成人T細胞白血病・リンパ腫

注射 内服	Rp	商品名	用量(回) 用量(日)	投与ルート	投与時間	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28																											
						照射部位	照射量	用法																									
注射	1	生理食塩液	200 ml	点滴	キープ	●	●																										
注射	2	グラニセトロン	3 mg	点滴(側管)	30分	●																											
注射	3	ドキシソルピシン	40 mg/m ²	点滴(側管)	30分	●																											
注射	4	生理食塩液	100 ml																														
注射	4	オンコピン	※1 mg/m ²	点滴(側管)	30分	●																											
注射	5	生理食塩液	100 ml		※最大2mg																												
注射	5	エンドキサソ	350 mg/m ²	点滴(側管)	2時間	●																											
注射	6	生理食塩液	500 ml																														
注射	6	生理食塩液	50 ml	点滴(側管)	キープ		●																										
注射	7	ポテリジオ	1 mg/kg	点滴(側管)	2時間		●																										
注射	7	生理食塩液	200 ml																														
注射	8	生理食塩液	50 ml	点滴(側管)	ルートフラッシュ		●																										
注射	9	ドキシソルピシン	30 mg/m ²	点滴(側管)	30分																												
注射	9	生理食塩液	100 ml																														
注射	10	サイメリン	60 mg/m ²	点滴(側管)	30分																												
注射	10	生理食塩液	100 ml																														
注射	11	生理食塩液	50 ml	点滴(側管)	ルートフラッシュ																												
注射	12	フィルデシン	2.4 mg/m ²	点滴(側管)	30分																												
注射	12	生理食塩液	100 ml																														
注射	13	ラステット	100 mg/m ²	点滴(側管)	2時間																												
注射	13	生理食塩液	500 ml																														
注射	14	カルボプラチン	250 mg/m ²	点滴(側管)	2時間																												
注射	14	生理食塩液	500 ml																														
注射	15	生理食塩液	50 ml	点滴(側管)	ルートフラッシュ																												
注射	16																																
注射	17																																
注射	18																																
注射	19																																
注射	20																																
内服	1	プレドニゾロン	40 mg/m ²	1日1(-2)回朝(昼)食後		●																											
内服	2	クロルフェニラミン	6 mg	ポテリジオ投与30分-1時間前			●																										
内服	3	カロナール	500 mg	ポテリジオ投与30分-1時間前			●																										
内服	4	プレドニゾロン	25 mg	ポテリジオ投与30分-1時間前			●																										
内服	5																																
内服	6																																
内服	7																																
内服	8																																
内服	9																																
内服	10																																
内服	11																																

特記事項

1、3コース目のday27or28に1回髄注(ATLL:LSG15髄注)
 休薬完了はday27。day28のポテリジオは2コース目のday28。
 ポテリジオの投与日は、1コース目VCAPのday2-5、2コース目以降はVCAP、VECPの-day1から-day3を基準日として2週間隔で8回投与。

減量規定

薬品名	標準投与量	1段階減量	2段階減量	3段階減量