

# 治療計画書

療法名 mLSG15+ポテリジオ(2-4コース目)

療法 1サイクル 4 週

疾患名 成人T細胞白血病・リンパ腫

注射 内服	Rp	商品名	用量(/回)	投与ルート	投与時間																																
			用量(/日)	用法					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
放射線		照射部位	照射量																																		
注射	1	生理食塩液	200 ml	点滴	キープ	●	●										●									●	●	●	●								
注射	2	グラニセトロン	3 mg	点滴(側管)	30分	●										●											●	●	●								
注射	3	ドキシソルピシン	40 mg/m <sup>2</sup>	点滴(側管)	30分		●																														
注射	4	生理食塩液	100 ml				●																														
注射	4	オンコピン	※1 mg/m <sup>2</sup>	点滴(側管)	30分		●																														
注射	4	生理食塩液	100 ml	※最大2mg			●																														
注射	5	エンドキサソ	350 mg/m <sup>2</sup>	点滴(側管)	2時間		●																														
注射	5	生理食塩液	500 ml				●																														
注射	6	生理食塩液	50 ml	点滴(側管)	キープ		●																				●										
注射	7	ポテリジオ	1 mg/kg	点滴(側管)	2時間		●																				●										
注射	7	生理食塩液	200 ml				●																				●										
注射	8	生理食塩液	50 ml	点滴(側管)	ルートフラッシュ		●																				●										
注射	9	ドキシソルピシン	30 mg/m <sup>2</sup>	点滴(側管)	30分																																
注射	9	生理食塩液	100 ml																																		
注射	10	サイメリン	60 mg/m <sup>2</sup>	点滴(側管)	30分																																
注射	10	生理食塩液	100 ml																																		
注射	11	生理食塩液	50 ml	点滴(側管)	ルートフラッシュ																																
注射	11	生理食塩液	50 ml	点滴(側管)																																	
注射	12	フィルデシン	2.4 mg/m <sup>2</sup>	点滴(側管)	30分																							●									
注射	12	生理食塩液	100 ml																									●									
注射	13	ラステット	100 mg/m <sup>2</sup>	点滴(側管)	2時間																							●	●	●							
注射	13	生理食塩液	500 ml																									●	●	●							
注射	14	カルボプラチン	250 mg/m <sup>2</sup>	点滴(側管)	2時間																							●									
注射	14	生理食塩液	500 ml																									●									
注射	15	生理食塩液	50 ml	点滴(側管)	ルートフラッシュ																							●	●	●							
注射	16																																				
注射	17																																				
注射	18																																				
注射	19																																				
注射	20																																				
内服	1	プレドニゾロン	40 mg/m <sup>2</sup>	1日1(-2)回朝(昼)食後			●																				●	●	●								
内服	2	クロルフェニラミン	6 mg	ポテリジオ投与30分-1時間前			●																					●									
内服	3	カロナール	500 mg	ポテリジオ投与30分-1時間前			●																					●									
内服	4	プレドニゾロン	25 mg	ポテリジオ投与30分-1時間前			●																					●									
内服	5																																				
内服	6																																				
内服	7																																				
内服	8																																				
内服	9																																				
内服	10																																				
内服	11																																				

### 特記事項

1、3コース目のday27or28に1回髄注(ATLL:LSG15髄注)  
 ポテリジオの投与日は、1コース目VCAPのday2-5、2コース目以降はVCAP、VECPの-day1から-day3を基準日として2週間隔で8回投与。

### 減量規定

薬品名	標準投与量	1段階減量	2段階減量	3段階減量