治療計画書 <u>療法名 dose dense EC(エピルビシン+シクロホスファミド) 療法</u> 1サイクル **2** 週

疾患名 進行乳癌

注射			用量(/回)	投与ルート	投与時間	1	П				2	,	П				3		Т				4	П			П
内服		商品名	用量(/日)	用法	ᅚᄀᄧᄞᄞ		2	3 4	_	6			10	11 1	0 10			6 1	7 10	10	20			3 24	25 (6 07	20
			四里(/ロ/	用法		<u> </u>	2	3 4	5	0	/ 0	9	10	1111	2 13	14 1	15 1	0 1	/ 10	19	20	21 2	2 23	7 24	25 2	.0 27	20
放射線		照射部位	照射量	0.40.10	1	<u> </u>				Н			Н				_	_	+		_		+	\sqcup	_	+	Н
		生理食塩液	20 ml	CVCポート	ルートキーブ																			11			
注射	1					•										4											
射	ļ '					•										•											
		パロノセトロン	0.75 mg	点滴	30分																			П			П
注		アロカリス	235 mg	***************************************	1	1																		11			
注射	2	デキサート	9.9 mg			•																					
נו		7 7 9 1	J.J IIIg			-																					
	_	上 四 今 佐 汝	F0 1	F 5th	15/					Н			Н						-		_		+	\vdash	_	+	Н
		生理食塩液	50 ml	点滴	15分	_																					
注射	3					•																					
射						Ĭ																					
		エピルビシン	90 mg/ m ²	点滴(側管)	15分																						
注射	١,	生理食塩液	50 ml																								
射	4					•										•											
					1								$ \cdot $														
		エンドキサン	600 mg/m ²	点滴(側管)	30分		П			П			П			Ħ			t		\dashv		\top	Ħ	+	+	П
注		生 理食 造 液	100 ml										Ш														
注射	5		.55 1111		+	•							Ш														
נו						-																					
	-	上四 条指注	FO 1	上油	15/\					Н			Н						+		_		+	+	_	+	\vdash
٠.		生理食塩液	50 ml	点滴	15分																						
注射	6					•																					
射						Ĭ																					
										Ш																	Ш
		ヘパリンNaロックシリンジ	100 IU	CVCポート																							
注射	١,																										
射	l ′					•										•											
						1																					
		ジーラスタ	3.6 mg	皮下注			H			Ħ			Ħ				Ť		t		7		\top	П		\top	П
注		2 37.7	0.0 1116	~ · · · ·		1																					
注射	8																										
ניג						-																					
						-	\vdash	-		H			H			+	+	+	╄	H	\dashv		+	+	+	+	Н
:+						-																					
注射	9					4																					
别						_																					
										Ш									╄				_	Ш	_	_	Щ
注射	10																										
射	''																										
内服	1	ナウゼリン	30 mg	1日3回毎	食前		•	9	•	•	•								•	•	•	•		П			П
内服		デカドロン	8 mg	1日1(-2)回朝	(昼)食後		•		(•)				П						•	(•)	T			П			П
		センノサイド	24 mg	1日1回寝	る前					П			П				(9 0	•				T	П	\top		П
内服							П			П			П				T		T		7			П			П
内服							П			П			П			Ħ			t		\dashv		\top	Ħ	+	+	П
内服							\vdash			H			Ħ			\dashv			t		\dashv			H	+		H
内服							H			\forall			\forall			+			H	H	\dashv		+	H	+	+	H
内服							\vdash	+		Н			Н	+		H	+		۰	H	\dashv		+	\dashv	+	+	Н
内服							\vdash	+		H	-		\vdash	+		+	+	+	+		\dashv	-	+	\dashv	+	+	\vdash
内服							\vdash			\vdash			\vdash			+			\vdash		\dashv		+	\dashv	+	+	\vdash
							\vdash	+		Н			\vdash	+		\vdash		-	\vdash		4		+	+	4	+	\vdash
放射線	<u> </u>		Gy		#± === == ==					Ш			Ш											Ш			Щ
特記事項													_														
-																											4
,,,,,																											
采而名																		-									
標準投与量																											
1段階減量 2段階減量 3段階減量		減重																	1								_
2段階減重		減重																	1								_
3段	肾.	测重																									