# 治療計画書

療法名　G-B(ベンダムスチン)(2～6サイクル目)　療法　1サイクル 4 週

疾患名　CD20陽性の濾胞性リンパ腫(6サイクル)

| 注射 / 内服 / 放射線 | Rp | 商品名 / 照射部位 | 用量(/回) / 用量(/日) / 照射量 | 投与ルート / 用法 | 投与時間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注射 | 1 | 生理食塩液 | 200 ml | 点滴 | キープ | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注射 | 2 | ガザイバ | 1000 mg/body | 点滴(側管) | フローシートに従う | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 生理食塩液 | 210 ml | 全量250mlに調製 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注射 | 3 | 生理食塩液 | 50 ml | 点滴(側管) | ルートフラッシュ | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注射 | 4 | グラニセトロン | 3 mg | 点滴(側管) | 30分 | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | デキサート | 6.6 mg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注射 | 5 | トレアキシン | 90 mg/㎡ | 点滴(側管) | 10分 | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 生理食塩液 | 50 ml | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注射 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注射 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注射 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注射 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注射 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 内服 | 1 | クロルフェニラミン | 6 mg | ガザイバ投与30分前 | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 内服 | 2 | カロナール | 1000 mg | ガザイバ投与30分前 | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 内服 | 3 | デカドロン | 8 mg | 1日1(-2)回朝(昼)食後 | | | | ● | ● | (●) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 内服 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 内服 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 内服 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 内服 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 内服 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 内服 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 内服 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 放射線 | | | Gy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

特記事項

副作用により減量を行った場合、以降投与量を維持し増量しない
ガザイバ:0．2又は0．22μmのインラインフィルターを使用すること。

減量規定

| 薬品名 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 標準投与量 | | | | | |
| 1段階減量 | | | | | |
| 2段階減量 | | | | | |
| 3段階減量 | | | | | |