治療計画書

療法名　Pol-R-B(ベンダムスチン)　1コース目　療法　1サイクル　3　週

疾患名　再発又は難治性のびまん性大細胞型B細胞リンパ腫(6サイクル)

注射/内服/放射線	Rp	商品名	用量(/回)/用量(/日)/照射量	投与ルート/用法	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
注射	1	生理食塩液	200 ml	点滴	キープ	●	●	●																								
注射	2	リツキシマブ	375 mg/㎡	点滴(側管)	フローシートに従う	●																										
		生理食塩液	ml	10倍希釈																												
注射	3	グラニセトロン	3 mg	点滴(側管)	30分		●	●																								
		デキサート	6.6 mg																													
注射	4	生理食塩液	50 ml	点滴(側管)	10分		●																									
注射	5	ポライビー	1.8 mg/kg	点滴(側管)	90分		●																									
		注射用水	20mg/mLで溶解																													
		生理食塩液	0.72-2.7mg/mLで希釈																													
注射	6	生理食塩液	50 ml	点滴(側管)	30分		●																									
注射	7	トレアキシン	90 mg/㎡	点滴(側管)	10分		●	●																								
		生理食塩液	50 ml																													
注射	8	生理食塩液	50 ml	点滴(側管)	ルートフラッシュ	●																										
注射	9																															
注射	10																															
内服	1	クロルフェニラミン	6 mg	リツキシマブ投与30分前		●																										
内服	2	イブプロフェン	200 mg	リツキシマブ投与30分前		●																										
内服	3	クロルフェニラミン	6 mg	ポライビー投与30分前			●																									
内服	4	イブプロフェン	200 mg	ポライビー投与30分前			●																									
内服	5	デカドロン	8 mg					●	●	(●)																						
内服	6																															
内服	7																															
内服	8																															
内服	9																															
内服	10																															
放射線			Gy																													

特記事項

・副作用により減量を行った場合、以降投与量を維持し増量しない
・リツキシマブの最大投与回数8回
・ポライビー:0.2又は0.22μmのインラインフィルターを使用して投与

減量規定

薬品名	ベンダムスチン	ポライビー			
標準投与量	90 mg/㎡	1.8 mg/kg			
1段階減量	70 mg/㎡	1.4 mg/kg			
2段階減量	50 mg/㎡	中止			
3段階減量	中止				