治療計画書

療法名　イミフィンジ＋ゲムシタビン+シスプラチン　療法　1サイクル 3 週

疾患名　治癒切除不能な胆道癌（最大8サイクル）

注射/内服/放射線	Rp	商品名	用量(/回)	投与ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
			用量(/日)	用法		1							8							15							22						
		照射部位	照射量																														
注射	1	生理食塩液	500 ml	点滴	90分	●							●																				
注射	2	生理食塩液	50 ml	点滴(側管)	15分	●																											
注射	3	イミフィンジ	※1500 mg/body	点滴(側管)	60分	●																											
		生理食塩液	100 ml																														
注射	4	生理食塩液	50 ml	点滴(側管)	15分	●																											
注射	5	生理食塩液	500 ml	点滴	90分	●							●																				
注射	6	グラニセトロン	3 mg	点滴	20分	●							●																				
		デキサート	9.9 mg																														
注射	7	ゲムシタビン	1000 mg/㎡	点滴	30分	●							●																				
		生理食塩液	100 ml																														
注射	8	生理食塩液	50 ml	点滴	10分	●							●																				
注射	9	シスプラチン	25 mg/㎡	点滴	1時間	●							●																				
		生理食塩液	250 ml	全量250mlに調製																													
注射	10	生理食塩液	500 ml	点滴	90分	●							●																				
注射	11	生理食塩液	500 ml	点滴	90分	●							●																				
注射	12																																
内服	1	デカドロン	8 mg	1日1(-2)回朝(昼)食後			●	●	(●)					●	●	(●)																	
内服	2																																
内服	3																																
放射線			Gy																														

特記事項

※体重30kg以下の場合、イミフィンジは20mg/kgで投与。
インラインフィルター（0.2又は0.22μm）を使用すること。

減量規定

薬品名	ゲムシタビン	シスプラチン			
標準投与量	1000 mg/㎡	CCr＞60	100 %		
1段階減量	800 mg/㎡	45＜CCr≦60	75 %		
2段階減量	600 mg/㎡	CCr≦45	中止		
3段階減量					