治療計画書

療法名　EC+キイトルーダ　療法　1サイクル 3 週

疾患名　ホルモン受容体陰性かつHER2陰性で再発高リスクの乳癌における術前療法（4コース）

注射 / 内服 / 放射線	Rp	商品名 / 照射部位	用量(/回) / 用量(/日) / 照射量	投与ルート / 用法	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
						1							2							3							4						
注射	1	生理食塩液	20 ml	CVCポート	ルートキープ	●																											
注射	2	生理食塩液	50 ml	点滴	15分	●																											
注射	3	キイトルーダ	200 mg/body	点滴(側管)	30分	●																											
		生理食塩液	100 ml																														
注射	4	生理食塩液	50 ml	点滴	15分	●																											
注射	5	パロノセトロン	0.75 mg	点滴	30分	●																											
		アロカリス	235 mg																														
		デキサート	9.9 mg																														
注射	6	生理食塩液	50 ml	点滴	15分	●																											
注射	7	エピルビシン	90 mg/㎡	点滴(側管)	15分	●																											
		生理食塩液	50 ml																														
注射	8	エンドキサン	600 mg/㎡	点滴(側管)	30分	●																											
		生理食塩液	100 ml																														
注射	9	生理食塩液	50 ml	点滴	15分	●																											
注射	10	ヘパリンNaロックシリンジ	100 IU	CVCポート		●																											
内服	1	ナウゼリン	30 mg	1日3回毎食前			●	●	●	●	●	●	●																				
内服	2	デカドロン	8 mg	1日1(-2)回朝(昼)食後			●	●	●	(●)																							
内服	3	センノサイド	24 mg	1日1回寝る前			●	●	●																								
内服	4																																
内服	5																																
内服	6																																
内服	7																																
内服	8																																
内服	9																																
内服	10																																
放射線			Gy																														

特記事項

インラインフィルター(0.2～5μm)を使用すること
ジーラスタは適宜使用

減量規定

薬品名	エンドキサン	エピルビシン			
標準投与量	600 mg/㎡	90 mg/㎡			
1段階減量	480 mg/㎡	72 mg/㎡			
2段階減量					
3段階減量					