治療計画書

療法名　Pol-R-CHP(1-6サイクル)　療法　1サイクル 3 週

疾患名　びまん性大細胞型B細胞リンパ腫(6サイクル)

注射/内服/放射線	Rp	商品名 / 照射部位	用量(/回) / 用量(/日) / 照射量	投与ルート / 用法	投与時間
注射	1	生理食塩液	200 ml	点滴	キープ
注射	2	リツキシマブ	375 mg/㎡	点滴(側管)	フローシートに従う
		生理食塩液	ml	10倍希釈	
注射	3	グラニセトロン	3 mg	点滴(側管)	30分
注射	4	生理食塩液	50 ml	点滴(側管)	10分
注射	5	ポライビー	1.8 mg/kg	点滴(側管)	90分
		注射用水	20mg/mLで溶解		初回忍容性あれば
		生理食塩液	0.72-2.7mg/mLで希釈		30分可
注射	6	生理食塩液	50 ml	点滴(側管)	30分
注射	7	ドキソルビシン	50 mg/㎡	点滴(側管)	30分
		生理食塩液	100 ml		
注射	8	エンドキサン	750 mg/㎡	点滴(側管)	2時間
		生理食塩液	500 ml		
注射	9	生理食塩液	50 ml	点滴(側管)	ルートフラッシュ
注射	10				
内服	1	クロルフェニラミン	6 mg	リツキシマブ投与30分前	
内服	2	イブプロフェン	200 mg	リツキシマブ投与30分前	
内服	3	クロルフェニラミン	6 mg	ポライビー投与30分前	
内服	4	イブプロフェン	200 mg	ポライビー投与30分前	
内服	5	プレドニゾロン	100 mg	1日1(-2)回朝(昼)食後	
内服	6				
内服	7				
内服	8				
内服	9				
内服	10				
放射線			Gy		



特記事項

・ポライビー：0.2又は0.22μmのインラインフィルターを使用して投与
・2サイクル目以降のポライビーは初回投与時に忍容性が良好であれば30分まで短縮可
・6サイクル終了後は、リツキシマブ療法を2サイクルまで投与可能

減量規定

薬品名	ポライビー	エンドキサン	ドキソルビシン		
標準投与量	1.8 mg/kg	75%量	75%量		
1段階減量	1.4 mg/kg	50%量	50%量		
2段階減量	1.0 mg/kg	中止	中止		
3段階減量	中止				