

治療計画書

療法名

ダラキューロ+Bd 1-3サイクル目

療法

1サイクル

3 週

疾患名 再発又は難治性の多発性骨髄腫(1-3サイクル目)

Rp	商品名	用量(/回)	投与ルート	投与時間																																			
		用量(/日)	用法		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28							
内服	照射部位	照射量																																					
注射	ダラキューロ	1800 mg/body	皮下注																																				
注射	ボルテゾミブ	1.3 mg/m ²	皮下注																																				
注射	生理食塩液	2.5mg/mLで溶解			●		●				●			●																									
注射																																							
注射																																							
注射																																							
注射																																							
注射																																							
注射																																							
注射																																							
注射																																							
注射																																							
内服	レナデックス	20 mg	ダラキューロ投与1-3時間前		●								●																										
内服	レナデックス	20 mg	1日1回朝食後			●	●	●					●					●																				●	
内服	クロルフェニラミン	6 mg	ダラキューロ投与1-3時間前		●								●																									●	
内服	カロナール	1000 mg	ダラキューロ投与1-3時間前		●								●																									●	
内服																																							
内服																																							
内服																																							
放射線		Gy																																					

特記事項

- ・末梢神経障害で休業後、症状が回復した場合はベルケイドを0.7mg/m²に減量し、週1回投与に変更する。
- ・Grade 3のインフュージョンリアクションが3回出現した場合およびGrade 4のインフュージョンリアクションが出現した場合は、ダラキューロの投与を中止する。
- ・75歳を超える、過小体重(BMI: 18.5kg/m²未満)、コントロール不良の糖尿病又はステロイド療法に対する忍容性がない、もしくは有害事象を発現した患者には、レナデックスを20mg/週に減量して投与可能。

減量規定

薬品名	ベルケイド						
標準投与量	1.3 mg/m ²						
1段階減量	1.0 mg/m ²						
2段階減量	0.7 mg/m ²						
3段階減量	投与中止						