治療計画書

療法名 ダラキューロ+Bd 9サイクル目以降 療法 1サイクル 3 週

疾患名 再発又は難治性の多発性骨髄腫(9サイクル目以降)

注射 / 内服 / 放射線	Rp	商品名 / 照射部位	用量(/回) / 用量(/日) / 照射量	投与ルート / 用法	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
注射	1	ダラキューロ	1800 mg/body	皮下注		●																											
注射	2																																
注射	3																																
注射	4																																
注射	5																																
注射	6																																
注射	7																																
注射	8																																
注射	9																																
注射	10																																
内服	1	レナデックス	20 mg	ダラキューロ投与1-3時間前		●																											
内服	2	クロルフェニラミン	6 mg	ダラキューロ投与1-3時間前		●																											
内服	3	カロナール	1000 mg	ダラキューロ投与1-3時間前		●																											
内服	4																																
内服	5																																
内服	6																																
内服	7																																
放射線			Gy																														

特記事項

・末梢神経障害で休薬後、症状が回復した場合はベルケイドを0.7mg/m2に減量し、週1回投与に変更する。
・Grade 3のインフュージョンリアクションが3回出現した場合およびGrade 4のインフュージョンリアクションが出現した場合は、ダラキューロの投与を中止する。
・75歳を超える、過小体重(BMI:18.5kg/m2未満)、コントロール不良の糖尿病又はステロイド療法に対する忍容性がない、もしくは有害事象を発現した患者には、レナデックスを20mg/週に減量して投与可能。

減量規定

薬品名	ベルケイド				
標準投与量	1.3 mg/㎡				
1段階減量	1.0 mg/㎡				
2段階減量	0.7 mg/㎡				
3段階減量	投与中止				