治療計画書

療法名　リツキサン(1週毎)　療法　1サイクル 1 週

疾患名　難治性ネフローゼ症候群(4サイクル)

注射/内服/放射線	Rp	商品名 / 照射部位	用量(/回) / 用量(/日) / 照射量	投与ルート / 用法	投与時間	1							2							3							4						
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
注射	1	生理食塩液	200 ml	点滴	キープ	●							●							●							●						
注射	2	リツキサン	※375 mg/㎡	点滴(側管)	フローシートに従う																											
		生理食塩液	ml	10倍希釈		●							●							●							●						
			※最大500mg																													
注射	3	生理食塩液	50 ml	点滴(側管)	ルートフラッシュ	●							●							●							●						
注射	4																															
注射	5																															
注射	6																															
注射	7																															
注射	8																															
注射	9																															
注射	10																															
内服	1	クロルフェニラミン	6 mg	リツキサン投与30分前		●							●							●							●						
内服	2	イブプロフェン	200 mg	リツキサン投与30分前		●							●							●							●						
内服	3																															
内服	4																															
内服	5																															
内服	6																															
内服	7																															
内服	8																															
内服	9																															
内服	10																															
放射線			Gy																													

特記事項

難治性感染ネフローゼ症候群の場合、1回あたりの最大投与量は500mgまで。

減量規定

薬品名					
標準投与量					
1段階減量					
2段階減量					
3段階減量					