治療計画書

療法名　オプジーボ(2週毎)+カボメティクス　療法　1サイクル 2 週

疾患名　根治切除不能又は転移性の腎細胞癌

注射 / 内服 / 放射線	Rp	商品名 / 照射部位	用量(/回) / 用量(/日) / 照射量	投与ルート / 用法	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
注射	1	生理食塩液	50 ml	点滴	15分	●														●													
注射	2	オプジーボ	240 mg/body	点滴	30分	●														●													
		生理食塩液	50 ml																														
注射	3	生理食塩液	50 ml	点滴	15分	●														●													
注射	4																																
注射	5																																
注射	6																																
注射	7																																
注射	8																																
注射	9																																
注射	10																																
内服	1	カボメティクス	40 mg	1日1回　空腹時		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
内服	2																																
内服	3																																
内服	4																																
内服	5																																
内服	6																																
内服	7																																
内服	8																																
内服	9																																
内服	10																																
放射線			Gy																														

特記事項

オプジーボ:インラインフィルター(0.2又は0.22μm)を使用すること。
カボメティクス単剤の場合:60mg/日。用量が「単剤投与」と「併用投与」で異なる。

減量規定

薬品名	カボメティクス				
標準投与量	40 mg				
1段階減量	20 mg				
2段階減量	20mg/日を隔日投与				
3段階減量	中止				