治療計画書

療法名　オプジーボ(4週毎)+カボメティクス　療法　1サイクル 4 週

疾患名　根治切除不能又は転移性の腎細胞癌

注射		商品名	用量(/回)	投与ルート	投与時間	1							2							3							4						
内服	Rp		用量(/日)	用法		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
放射線		照射部位	照射量																													
注射	1	生理食塩液	50 ml	点滴	15分	●																										
注射	2	オプジーボ	480 mg/body	点滴	30分	●																										
		生理食塩液	50 ml																													
注射	3	生理食塩液	50 ml	点滴	15分	●																										
注射	4																															
注射	5																															
注射	6																															
注射	7																															
注射	8																															
注射	9																															
注射	10																															
内服	1	カボメティクス	40 mg	1日1回　空腹時		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
内服	2																															
内服	3																															
内服	4																															
内服	5																															
内服	6																															
内服	7																															
内服	8																															
内服	9																															
内服	10																															
放射線			Gy																													

特記事項

オプジーボ：インラインフィルター(0.2又は0.22μm)を使用すること。
カボメティクス単剤の場合：60mg/日。用量が「単剤投与」と「併用投与」で異なる。

減量規定

薬品名	カボメティクス				
標準投与量	40 mg				
1段階減量	20 mg				
2段階減量	20mg/日を隔日投与				
3段階減量	中止				