(ID　0　) ☆7

治療計画書

療法名　フェスゴ+ビノレルビン　療法　1サイクル 3 週

疾患名　HER2陽性の手術不能又は再発乳がん

注射 / 内服 / 放射線	Rp	商品名 / 照射部位	用量(/回) / 用量(/日) / 照射量	投与ルート / 用法	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
注射	1	フェスゴIN≪初回≫	15 ml	皮下注	※8分以上	●																											
		※※経過観察30分																															
		フェスゴMA≪2回目以降≫	10 ml	皮下注	※5分以上																												
		※※経過観察15分																															
注射	2	生理食塩液	20 ml	CVCポート	ルートキープ	●							●																				
注射	3	ナベルビン	25 mg/㎡	点滴	10分	●							●																				
		生理食塩液	50 ml																														
注射	4	生理食塩液	50 ml	点滴	15分	●							●																				
注射	5	ヘパリンNaロックシリンジ	100 IU	CVCポート		●							●																				
注射	6																																
注射	7																																
注射	8																																
注射	9																																
注射	10																																
内服	1																																
内服	2																																
内服	3																																
内服	4																																
内服	5																																
内服	6																																
内服	7																																
内服	8																																
内服	9																																
放射線			Gy																														

特記事項

※初回投与時は8分以上かけて大腿部に皮下投与。2回目以降は5分以上かけて皮下投与。
※※初回投与終了後30分の経過観察。2回目以降容認性が認められる場合は15分に短縮可。
末梢から投与する場合は、静脈炎予防のためナベルビン投与後に生理食塩液200mlを投与する。

減量規定

薬品名					
標準投与量					
1段階減量					
2段階減量					
3段階減量					