治療計画書

療法名　フェスゴ＋ドセタキセル　療法　1サイクル 3 週

疾患名　HER2陽性の乳癌

注射 / 内服 / 放射線	Rp	商品名 / 照射部位	用量(/回) / 用量(/日) / 照射量	投与ルート / 用法	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
注射	1	フェスゴIN≪初回≫	15 ml	皮下注	※8分以上	●																											
		※※経過観察30分																															
		フェスゴMA≪2回目以降≫	10 ml	皮下注	※5分以上																												
		※※経過観察15分																															
注射	1	生理食塩液	20 ml	CVCポート	ルートキープ	●																											
注射	6	ファモチジン	20 mg	点滴	30分	●																											
		デキサート	6.6 mg																														
		生理食塩液	50 ml																														
注射	7	ドセタキセル	75 mg/㎡	点滴	1時間	●																											
		生理食塩液	250 ml																														
注射	8	生理食塩液	50 ml	点滴	15分	●																											
注射	9	ヘパリンNaロックシリンジ	100 IU	CVCポート		●																											
注射	7																																
注射	8																																
注射	9																																
注射	10																																
内服	1	レスタミン	50 mg	ドセタキセルの30分前まで		●																											
内服	2	デカドロン	8 mg	1日1(-2)回朝(昼)食後			●	●																									
内服	3																																
内服	4																																
内服	5																																
内服	6																																
内服	7																																
内服	8																																
内服	9																																
内服	10																																
放射線			Gy																														

特記事項

※初回投与時は8分以上かけて大腿部に皮下投与。2回目以降は5分以上かけて皮下投与。
※※初回投与終了後30分の経過観察。2回目以降容認性が認められる場合は15分に短縮可。
術前術後療法の場合は最大12ヶ月まで。

減量規定

薬品名	ドセタキセル				
標準投与量	75 mg/㎡				
1段階減量	55 mg/㎡				
2段階減量					
3段階減量					