同席または
確認看護師 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（自署）

治療計画書

療法名 シスプラチン＋イリノテカン 療法 1サイクル 4 週

疾患名 神経内分泌腫瘍

注射/内服/放射線	Rp	商品名	用量(/回)	投与ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
			用量(/日)	用法																													
		照射部位	照射量																														
注射	1	アロキシ	0.75 mg	点滴	30分																												
		デキサート	9.9 mg			●																											
		生理食塩液	100 ml																														
注射	2	グラニセトロン	3 mg	点滴	30分																												
		デキサート	6.6-9.9 mg										●							●													
注射	3	生理食塩液	500 ml	点滴	2時間																												
		硫酸Mg補正液	8 mEq			●																											
注射	4	生理食塩液	50 ml	点滴	15分																												
													●							●													
注射	5	イリノテカン	60 mg/㎡	点滴	2時間																												
		生理食塩液	500 ml			●							●							●													
注射	6	生理食塩液	500 ml	点滴	2時間																												
						●																											
注射	7	シスプラチン	60 mg/㎡	点滴	2時間																												
		生理食塩液	500 ml	全量500mlに調製		●																											
注射	8	YDソリターT3	500 ml	点滴	2時間																												
		フロセミド	20 mg			●																											
注射	9	YDソリターT3	500 ml	点滴	2時間		●	●																									
							●	●																									
注射	10	ソリューゲンF	500 ml	点滴	2時間																												
						●	●	●																									
注射	11	生理食塩液	50 ml	点滴	15分																												
													●							●													
注射	12																																
内服	1	アプレピタント	125 mg	抗癌剤の1時間-1時間半前		●																											
内服	2	アプレピタント	80 mg	1日1回朝食後			●	●																									
内服	3	デカドロン	8 mg	1日1(-2)回朝(昼)食後			●	●	●	(●)				●	●	(●)					●	●	(●)										
内服	4	半夏瀉心湯※	7.5 g	1日3回食間/食前						●	●	●					●	●	●														
内服	5	ウルソ	300 mg	1日3回食後		●	●	●	●				●	●	●	●				●	●	●	●										
内服	6	メトクロプラミド	15 mg	1日3回食前		●	●	●	●				●	●	●	●				●	●	●	●										
内服	7	重曹	3 g	1日3回食間		●	●	●	●				●	●	●	●				●	●	●	●										
内服	8	酸化マグネシウム/マグラックス	1.2-1.8 g	1日3回食後		●	●	●	●				●	●	●	●				●	●	●	●										
内服	9																																
内服	10																																

特記事項

※トポテシン投与3日前～前日まで

減量規定

薬品名	イリノテカン	シスプラチン			
標準投与量	60 mg/㎡	60 mg/㎡			
1段階減量	50 mg/㎡	50 mg/㎡			
2段階減量	40 mg/㎡	40 mg/㎡			