(ID　0　) ☆7

治療計画書

療法名　カルボプラチン+ペメトレキセド＋イジュド+イミフィンジ　療法　1サイクル　3　週

疾患名　切除不能な進行・再発の非扁平上皮非小細胞肺がん（4サイクル）

注射 / 内服 / 放射線	Rp	商品名 / 照射部位	用量(/回) / 用量(/日) / 照射量	投与ルート / 用法	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
注射	1	生理食塩液	50 ml	点滴	15分	●																											
注射	2	イジュド	75 mg	点滴	60分	●																											
		生理食塩液	50 ml																														
注射	3	生理食塩液	50 ml	点滴	30分	●																											
注射	4	イミフィンジ	1500 mg	点滴	60分	●																											
			※1																														
		生理食塩液	100 ml																														
注射	5	生理食塩液	50 ml	点滴	15分	●																											
注射	6	パロノセトロン	0.75 mg	点滴	30分	●																											
		デキサート	6.6 mg																														
注射	7	生理食塩液	50 ml	点滴	15分	●																											
注射	8	ペメトレキセド	500 mg/㎡	点滴	10分	●																											
		生理食塩液	100 ml																														
注射	9	生理食塩液	50 ml	点滴	15分	●																											
注射	10	カルボプラチン	※AUC5-6	点滴	90分	●																											
		生理食塩液	250 ml																														
			※最大800mg																														
注射	11	生理食塩液	50 ml	点滴	15分	●																											
注射	12	メチコバール	1 mg	筋注		ペメトレキセド初回投与の少なくとも7日前に，ビタミンB12として1回1mgを筋肉内投与する。その後，アリムタ投与期間中及び投与中止後22日目まで9週ごと（3コースごと）に1回投与する。																									
注射	13																																
内服	1	デカドロン	8 mg	1日1(-2)回朝(昼)食後			●	●																									
内服	2	パンビタン（葉酸0.5mg/g）	1 g	1日1回連日投与		アリムタ初回投与の7日以上前から1日1回0.5mgを連日経口投与し、最終投与日から22日目まで継続																									
内服	3																																

特記事項

ペメトレキセドによる重篤な副作用軽減のため葉酸およびビタミンB12を投与する（添付文書参照）。
イミフィンジ、イジュド：インラインフィルター（0.2～0.22μm）を使用すること。
4サイクル終了後、5サイクル目イミフィンジ+ペメトレキセド療法、6サイクル目イジュド＋イミフィンジ＋ペメトレキセド療法、7サイクル目以降はイミフィンジ＋ペメトレキセド療法を行う。
※1：体重30kg以下の場合のイミフィンジ1回投与量は20mg/kg（体重）とする。

減量規定

薬品名					
標準投与量					
1段階減量					
2段階減量					
3段階減量					