(ID　0　) ☆7

治療計画書

療法名　XELOX+ビロイ　　療法　1サイクル 3 週

疾患名　CLDN18.2陽性の治癒切除不能な進行・再発の胃がん

注射/内服/放射線	Rp	商品名 / 照射部位	用量(/回) / 用量(/日) / 照射量	投与ルート / 用法	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
注射	1	パロノセトロン	0.75 mg	点滴	15分	●																											
		デキサート	9.9 mg																														
注射	2	生理食塩液	50 ml	点滴	10分	●																											
注射	3	ビロイ≪初回≫	800 mg/㎡	点滴	フローシートに従う	●																											
		注射用水	20mg/mLで溶解		※																												
		生理食塩液	2mg/mLで希釈																														
		ビロイ≪2回目以降≫	600 mg/㎡	点滴	フローシートに従う																												
		注射用水	20mg/mLで溶解		※																												
		生理食塩液	2mg/mLで希釈																														
注射	4	生理食塩液	50 ml	点滴	10分	●																											
注射	5	エルプラット	130 mg/㎡	点滴	2時間	●																											
		5%糖液	250 ml																														
注射	6	生理食塩液	50 ml	点滴	10分	●																											
注射	7																																
内服	1	カペシタビン	2000 mg/㎡	1日2回朝夕食後※※		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●														
内服	2	アプレピタント	125 mg	抗癌剤の1時間-1時間半前		●																											
内服	3	アプレピタント	80 mg	1日1回朝食後			●	●																									
内服	4	デカドロン	8 mg	1日1(-2)回朝(昼)食後			●	●	●																								

特記事項

※※day1夕食後からday15朝食後に服用

カペシタビン減量基準	1日投与量		
	初回投与量	減量段階1	減量段階2
1.36㎡未満	2400mg/日	1800mg/日	1200mg/日
1.36㎡以上1.41㎡未満	3000mg/日		
1.41㎡以上1.51㎡未満		2400mg/日	
1.51㎡以上1.66㎡未満			1800mg/日
1.66㎡以上1.81㎡未満	3600mg/日		
1.81㎡以上1.96㎡未満		3000mg/日	
1.96㎡以上2.11㎡未満	4200mg/日		
2.11㎡以上			2400mg/日

※ビロイの投与速度は、患者の忍容性が良好であれば下記で投与する。悪心、嘔吐、アレルギー等が発現した場合は、投与の中断、中止を考慮する。

【初回】XELOX+ビロイ

体表面積（㎡）	投与速度（mL/時間）		
	投与開始から30分後まで	投与30分後から投与90分後	その後
1.0～1.1	50	100	200
1.1～1.2	55	110	220
1.2～1.3	60	120	240
1.3～1.4	65	130	260
1.4～1.5	70	140	280
1.5～1.6	75	150	300
1.6～1.7	80	160	320
1.7～1.8	85	170	340
1.8～1.9	90	180	360
1.9～2.0	95	190	380
2.0～2.1	100	200	400
2.1～2.2	105	210	420
2.2～2.3	110	220	440

【2回目以降】XELOX+ビロイ

体表面積（㎡）	投与速度（mL/時間）		
	投与開始から30分後まで	投与30分後から投与90分後	その後
1.0～1.1	38	75	150
1.1～1.2	41	83	165
1.2～1.3	45	90	180
1.3～1.4	49	98	195
1.4～1.5	53	105	210
1.5～1.6	56	113	225
1.6～1.7	60	120	240
1.7～1.8	64	128	255
1.8～1.9	68	135	270
1.9～2.0	71	143	285
2.0～2.1	75	150	300
2.1～2.2	78	157	315
2.2～2.3	82	165	330

減量規定

薬品名	エルプラット	カペシタビン※※			
標準投与量	130 mg/㎡	上記参照			
1段階減量	100 mg/㎡				
2段階減量	75 mg/㎡				
3段階減量		中止（CCr≦30）			