治療計画書

療法名　キイトルーダ（3週毎）＋S-1＋シスプラチン　療法　1サイクル　3　週

疾患名　治癒切除不能な進行・再発の胃癌

注射 / 内服 / 放射線	Rp	商品名 / 照射部位	用量(/回) / 用量(/日) / 照射量	投与ルート / 用法	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
注射	1	生理食塩液	500 ml	点滴	2時間	●																											
注射	2	キイトルーダ	200 mg/body	点滴	30分	●																											
		生理食塩液	100 ml																														
注射	3	生理食塩液	500 ml	点滴	2時間	●																											
注射	4	グラニセトロン	3 mg	点滴	30分	●																											
		デキサート	9.9 mg																														
注射	5	シスプラチン	60 mg/㎡	点滴	2時間	●																											
		生理食塩液	500 ml	全量500mlに調製																													
注射	6	フロセミド	10 mg	静注(側管)		●																											
注射	7	ソリューゲンF	500 ml	点滴	2時間	●																											
注射	8	ソリューゲンF	500 ml	点滴	2時間	●																											
注射	9																																
注射	10																																
注射	11																																
内服	1	S-1※	80 mg/㎡	1日2回朝夕食後		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●														
内服	2	アプレピタント	125 mg	シスプラチン投与60～90分前		●																											
内服	3	アプレピタント	80 mg	1日1回朝食後			●	●																									
内服	4	デカドロン	8 mg	1日1(-2)回朝(昼)食後			●	●	●																								
内服	5																																
内服	6																																
内服	7																																
内服	8																																

特記事項

キイトルーダは最大35サイクルまで。
インラインフィルター（0.2～5μm）を使用すること。
※S-1は1日目の夕食後より服用開始。

減量規定

薬品名	シスプラチン	S-1（1.25㎡未満）	S-1（1.25㎡以上1.50㎡未満）	S-1（1.50㎡以上）
標準投与量	60 mg/㎡	80 mg/day	100 mg/day	120 mg/day
1段階減量	50 mg/㎡		80 mg/day	100 mg/day
2段階減量	40 mg/㎡			80 mg/day
3段階減量	30 mg/㎡			