治療計画書

療法名　mFOLFOX6+ビロイ　療法　1サイクル 2 週

疾患名　CLDN18.2陽性の治癒切除不能な進行・再発の胃癌

注射/内服/放射線	Rp	商品名	用量(/回)/用量(/日)/照射部位	照射量	投与ルート/用法	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
							1							2							3							4						
注射	1	生理食塩液	20 ml		CVCポート	ルートフラッシュ	●														●													
注射	2	パロノセトロン	0.75 mg		点滴	15分	●														●													
		デキサート	9.9 mg																															
注射	3	生理食塩液	50 ml		点滴	10分	●														●													
注射	4	ビロイ≪初回≫	800 mg/㎡		点滴	フローシートに従う	●														●													
		注射用水	20mg/mLで溶解			※																												
		生理食塩液	2mg/mLで希釈																															
		ビロイ≪2回目以降≫	400 mg/㎡		点滴	フローシートに従う																												
		注射用水	20mg/mLで溶解			※																												
		生理食塩液	2mg/mLで希釈																															
注射	5	生理食塩液	50 ml		点滴	10分	●														●													
注射	6	エルプラット	85 mg/㎡		点滴	2時間	●														●													
		5%糖液	250 ml																															
注射	7	レボホリナート	200 mg/㎡		点滴(側管)	2時間	●														●													
		生理食塩液	200 ml																															
注射	8	5-FU	400 mg/㎡		点滴	全開	●														●													
		生理食塩液	50 ml																															
注射	9	生理食塩液	50 ml		点滴	10分	●														●													
注射	10	5-FU	2400 mg/㎡		持続注入用ポンプ	46時間	●	●	●												●	●	●											
		生理食塩液	100 ml		46時間投与となるよう																													
					生食で調製																													
注射	11	ヘパリンNaロックシリンジ	100 IU		CVCポート				●														●											
内服	1	アプレピタント	125 mg		抗癌剤の1時間-1時間半前		●														●													
内服	2	アプレピタント	80 mg		1日1回朝食後			●	●													●	●											
内服	3	デカドロン	8 mg		1日1(-2)回朝(昼)食後			●	●	●												●	●	●										

特記事項

※ビロイの投与速度は、患者の忍容性が良好であれば下記で投与する。悪心、嘔吐、アレルギー等が発現した場合は、投与の中断、中止を考慮する。

【初回】mFOLFOX6+ビロイ

体表面積（㎡）	投与速度（mL/時間）		
	投与開始から30分後まで	投与30分後から投与90分後	その後
1.0～1.1	50	100	200
1.1～1.2	55	110	220
1.2～1.3	60	120	240
1.3～1.4	65	130	260
1.4～1.5	70	140	280
1.5～1.6	75	150	300
1.6～1.7	80	160	320
1.7～1.8	85	170	340
1.8～1.9	90	180	360
1.9～2.0	95	190	380
2.0～2.1	100	200	400
2.1～2.2	105	210	420
2.2～2.3	110	220	440

【2回目以降】mFOLFOX6+ビロイ

体表面積（㎡）	投与速度（mL/時間）		
	投与開始から30分後まで	投与30分後から投与90分後	その後
1.0～1.1	25	50	100
1.1～1.2	28	55	110
1.2～1.3	30	60	120
1.3～1.4	33	65	130
1.4～1.5	35	70	140
1.5～1.6	38	75	150
1.6～1.7	40	80	160
1.7～1.8	43	85	170
1.8～1.9	45	90	180
1.9～2.0	48	95	190
2.0～2.1	50	100	200
2.1～2.2	52	105	210
2.2～2.3	55	110	220

減量規定

薬品名	エルプラット	5-FU(急速)	5-FU(持続)		
標準投与量	85 mg/㎡	400 mg/㎡	2400 mg/㎡		
1段階減量	65 mg/㎡	320 mg/㎡	1900 mg/㎡		
2段階減量	50 mg/㎡	260 mg/㎡	1500 mg/㎡		
3段階減量					