

治療計画書

療法名 **キイトルーダ(3週毎)+ゲムシタビン+シスプラチン** 療法 1サイクル **3** 週

疾患名 **治療切除不能な胆道癌**

注射 内服 放射線	Rp	商品名	用量(/回) 用量(/日)	投与ルート	投与時間																													
						用法																												
		照射部位	照射量																															
注射	1	生理食塩液	500 ml	点滴	90分																													
注射	2	生理食塩液	50 ml	点滴(側管)	15分																													
注射	3	キイトルーダ	200 mg/body	点滴(側管)	30分																													
		生理食塩液	100 ml																															
注射	4	生理食塩液	50 ml	点滴(側管)	15分																													
注射	5	生理食塩液	500 ml	点滴	90分																													
注射	6	グラニセトロン	3 mg	点滴	20分																													
		デキササート	9.9 mg																															
注射	7	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	点滴	30分																													
		生理食塩液	100 ml																															
注射	8	生理食塩液	50 ml	点滴	10分																													
注射	9	シスプラチン	25 mg/m ²	点滴	1時間																													
		生理食塩液	250 ml	全量250mlに調製																														
注射	10	生理食塩液	500 ml	点滴	90分																													
注射	11	生理食塩液	500 ml	点滴	90分																													
注射	12																																	
内服	1	デカドロン	8 mg	1日1(-2)回朝(昼)食後		●	●	●																										
内服	2																																	
内服	3																																	
放射線			Gy																															

特記事項

キイトルーダは最大35サイクル、シスプラチンは最大8サイクルまで。
インラインフィルター(0.2~5 μm)を使用すること。

減量規定

薬品名	ゲムシタビン	シスプラチン	
標準投与量	1000 mg/m ²	CCr>60	100 %
1段階減量	750 mg/m ²	51<CCr≤60	75 %
2段階減量	500 mg/m ²	40<CCr≤50	50 %
3段階減量		CCr≤40	中止