治療計画書

療法名　キイトルーダ（3週毎）　療法　1サイクル 3 週

疾患名　がん化学療法後に増悪した高い腫瘍遺伝子変異量（TMB High）を有する進行・再発の固形癌（標準的な治療が困難な場合に限る）（最長2年間）

注射 / 内服 / 放射線	Rp	商品名 / 照射部位	用量(/回) / 用量(/日) / 照射量	投与ルート / 用法	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
注射	1	生理食塩液	50 ml	点滴	15分	●																											
注射	2	キイトルーダ	200 mg/body	点滴	30分	●																											
		生理食塩液	100 ml																														
注射	3	生理食塩液	50 ml	点滴	15分	●																											
注射	4																																
注射	5																																
注射	6																																
注射	7																																
注射	8																																
注射	9																																
注射	10																																
内服	1																																
内服	2																																
内服	3																																
内服	4																																
内服	5																																
内服	6																																
内服	7																																
内服	8																																
内服	9																																
内服	10																																
放射線			Gy																														

特記事項

インラインフィルター（0.2～5μm）を使用すること。

減量規定

薬品名					
標準投与量					
1段階減量					
2段階減量					
3段階減量					