治療計画書

療法名　5-FU+マイトマイシン+RT　療法　1サイクル　4　週

疾患名　肛門がん(2サイクル)

注射/内服/放射線	Rp	商品名 / 照射部位	用量(/回) / 用量(/日) / 照射量	投与ルート / 用法	投与時間
注射	1	デキサート	6.6 mg	点滴	15分
		生理食塩液	100 ml		
注射	2	生理食塩液	50 ml	点滴	15分
注射	3	マイトマイシン	※10 mg/㎡	点滴	全開
		生理食塩液	50ml	2mg/5mlで溶解	
			※最大20mg		
注射	4	生理食塩液	50 ml	点滴	15分
注射	5	デキサート	6.6 mg	点滴(側管)	15分
		生理食塩液	100 ml		
注射	6	5-FU	1000 mg/㎡	点滴	24時間
		生理食塩液	500 ml		
注射	7	生理食塩液	50 ml	点滴	15分
注射	8				
注射	9				
注射	10				
内服	1				
内服	2				
内服	3				
内服	4				
内服	5				
内服	6				
内服	7				
内服	8				
内服	9				
内服	10				
放射線			1.8 Gy/day	33回照射	



特記事項

体格や年齢によっては5FUの初期投与量を800mg/m2に減量してもよい。2サイクル行うが、放射線照射は約30回前後とし、計59.4Gy以下とする。
G4の血液毒性→マイトマイシンC、5FU共に50%減。G3以上の下痢→5FUのみ50%減。G3以上の粘膜炎/口内炎→5FUのみ50%減、G3以上の皮膚炎→5FUのみ50%減、G4以上の皮膚炎→5FU中止、放射線性皮膚炎はG3に回復するまで休止

減量規定

薬品名						
標準投与量						
1段階減量						
2段階減量						
3段階減量						