治療計画書

療法名　カペシタビン+マイトマイシン+RT　療法　1サイクル　6　週

疾患名　肛門がん（1サイクル）

注射/内服/放射線	Rp	商品名 / 照射部位	用量(/回) / 用量(/日) / 照射量	投与ルート / 用法	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
注射	1	デキサート	6.6 mg	点滴	30分	●																																									
		生理食塩液	100ml																																												
注射	2	生理食塩液	50 ml	点滴	15分	●																																									
注射	3	マイトマイシン	※12 mg/㎡	点滴	全開	●																																									
		生理食塩液	50ml	2mg/5mlで溶解																																											
			※最大20mg																																												
注射	4	生理食塩液	50 ml	点滴	15分	●																																									
注射	5																																															
注射	6																																															
注射	7																																															
注射	8																																															
注射	9																																															
注射	10																																															
内服	1	カペシタビン	1650 mg/㎡	1日2回朝夕食後		●●●●●							●●●●●							●●●●●							●●●●●							●●●●●							●●●●●					
内服	2																																															
内服	3																																															
内服	4																																															
内服	5																																															
内服	6																																															
内服	7																																															
内服	8																																															
内服	9																																															
内服	10																																															
放射線			50.4 Gy	28回照射		●●●●●							●●●●●							●●●●●							●●●●●							●●●●●							●●●					

特記事項

減量規定

薬品名		
標準投与量		
1段階減量		
2段階減量		
3段階減量		