治療計画書

療法名

キイトルーダ+パドセブ

1サイクル 3 週 療法

疾患名 根治切除不能な尿路上皮癌

1/\/\			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,																										_
注射			用量(/回)	投与ルート	也与時間	1						2						3						4	\top	\top	\vdash	П	П
内服	р.	商品名	用量(/日)	用法	双一时间		_	0 4	-			2	0 1	0 1	1 1	0 10			10	17 1	0 10	00	21 2		20 0	4 01	-	07	00
放射線	Кр		加里(/口/	用冱		Ľ	2	3 4	0	В	/	8	9 1	U	1 1	2 13	14	10	10	17 1	8 19	20	21 2	.2 2	23 2	4 20	20	27	28
放射線		照射部位	照射量	F '*	20.4		_			Н												_	\vdash	+	4	+	Н	Н	\dashv
		デキサート	6.6 mg	点滴	30分]																							
注射	1	生理食塩液	100 ml																										
射																													
		生理食塩液	50 ml	点滴	15分																								
注																													
注射	2					•					- 1																		
						1																							
		パドセブ	※ 1.25 mg/kg	点滴	30分					Н				t					H					\pm	\top	+	Ħ	Ħ	
注		生理食塩液	50 ml	注射用水で溶解																									
注射	3		※最大125mg	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7																									
23			/AQX/TZOINg			-												H											
注射		生理食塩液	100 ml	点滴	※※初回30分		-		-	Н		+	+	+	-	+		Н		+		\vdash	\vdash	+	+	+	H	H	
		<u> </u>	100 mi	从 间																									
	4				2回目以降																								
					15分可																								
			000 "	F '*	00.4					Н		4							\sqcup	4				+	4	+	$\mathbf{\mu}$	\square	\dashv
注射		キイトルーダ	200 mg/body	点滴	30分	•																							
	5	生理食塩液	100 ml																										
						-																							
注射	l	生理食塩液	50 ml	点滴	15分	•	-			Н			+	+		+	H					⊢		+	+	+	Н	\vdash	\dashv
		工生及塩水	30 1111	示 心	1371																								
	6																												
										П														†	\top	+	Ħ	H	一
注						1																							
注射	7					-																							
711						1																							
									+	H		+	+		+	+			H		\vdash		H	+	+	+	H	H	=
注						1																							
注射	8					-																							
别						-																							
							_			Н				-										+	+	+	H	\vdash	\dashv
注射						-																							
	9					4																							
						4																							
							_			\vdash			-		+		\vdash		\dashv			_		+	4	+	\vdash	\vdash	\dashv
注	10																												
射																													
										Ш						-			Щ					4	4		ш		\dashv
内服	1									Ш		_							Щ				\Box	\perp	4	\perp	\sqcup	Ш	Ц
内服	2						_			Ш												L		\bot	4	4	ш	Ш	ᆈ
内服	_									Ш									Ш					\perp	4	\perp	Ш		Ш
内服	4									Ш									Ш					\perp	4	\perp	Ш		Ш
内服	5									Ш									Ц					\perp	\perp	\perp	Ш	Ш	Ш
内服	6									Ш									Ш										
内服	7																										\perp		
内服							T			L∏	T								$oxedsymbol{oxed}$				$oxed{L}$				$\mathbb{L}^{\mathbb{T}}$		_Ī
内服																											П		
内服	10											T												T	Т		П		П
放射線			Gy																						T		П		П
					特記事項								_									_							╗
イン	51	インフィルター(0.2~5μm)を使用	すること。																										T

インラインフィルター $(0.2 \sim 5 \mu m)$ を使用すること。 キイトルーダは最大35サイクル。

※※Rp4の生食は初回30分で投与、パドセブの忍容性が良ければ2回目以降15分で投与可。

減量規定 薬品名 標準投与量 パドセブ 最大125mg 最大100mg 最大75mg 1.25 mg/kg 1段階減量 1 mg/kg 2段階減量 0.75 mg/kg 3段階減量