治療計画書

療法名　トロデルビ　療法　1サイクル 3 週

疾患名　化学療法歴のあるホルモン受容体陰性かつHER2陰性の手術不能又は再発乳癌

注射		商品名	用量(/回)	投与ルート	投与時間	1							2							3							4						
内服	Rp		用量(/日)	用法		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
放射線		照射部位	照射量																													
注射	1	生理食塩液	20 ml	CVCポート	ルートキープ	●							●																			
注射	2	パロノセトロン	0.75 mg	点滴	30分	●							●																			
		アロカリス	235 mg																													
		ファモチジン	20 mg																													
		デキサート	6.6 mg																													
注射	3	生理食塩液	50 ml	点滴	15分	●							●																			
注射	4	トロデルビ	10 mg/kg	点滴	3時間	●							●																			
		生理食塩液	※250 ml	2回目以降1～2時間可																												
注射	5	生理食塩液	50 ml	点滴	30分	●							●																			
注射	6	ヘパリンNaロックシリンジ	100 IU	CVCポート		●							●																			
注射	7																															
注射	8																															
注射	9																															
注射	10																															
内服	1	レスタミン	50 mg	トロデルビの30分前まで		●							●																			
内服	2	カロナール	500 mg	トロデルビの30分前まで		●							●																			
内服	3																															
内服	4																															
内服	5																															
内服	6																															
内服	7																															
内服	8																															
内服	9																															
内服	10																															
放射線			Gy																													

特記事項

※トロデルビの投与量が750mgを超える場合は生食500mlで希釈、275mg未満の場合は生食100mlで希釈する。(もしくは1.1～3.4mg/mlで希釈)

減量規定

薬品名	トロデルビ				
標準投与量	10 mg/kg				
1段階減量	7.5 mg/kg				
2段階減量	5 mg/kg				
3段階減量	中止				