(ID　0　) ☆7

治療計画書

療法名 ライブリバント(体重80kg以上)+ラズクルーズ(1サイクル目)　療法　1サイクル 4 週

EGFR遺伝子変異陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺がん

注射	Rp	商品名	用量(/回)	投与ルート	投与時間	1							2							3							4						
内服			用量(/日)	用法		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
放射線		照射部位	照射量																														
注射	1	デキサート	9.9 mg	点滴	15分																												
		生理食塩液	50 ml																														
						●	●																										
注射	2	生理食塩液	100 ml	点滴	45分																												
						●	●																										
注射	3	ライブリバント	350 mg	点滴	50ml/時																												
		生理食塩液	250 ml		※	●																											
			全量250mlに調製																														
注射	4	ライブリバント	1050 mg	点滴	35ml/時																												
		生理食塩液	250 ml		※		●																										
			全量250mlに調製																														
注射	5	生理食塩液	50 ml	点滴	15分																												
													●							●							●						
注射	6	ライブリバント	1400 mg	点滴	65ml/時																												
		生理食塩液	250 ml										●																				
			全量250mlに調製																														
注射	7	ライブリバント	1400 mg	点滴	85ml/時																												
		生理食塩液	250 ml																	●													
			全量250mlに調製																														
注射	8	ライブリバント	1400 mg	点滴	125ml/時																												
		生理食塩液	250 ml																								●						
			全量250mlに調製																														
注射	9	生理食塩液	50 ml	点滴	30分																												
						●	●						●							●							●						
注射	10																																
内服	1	ラズクルーズ	240 mg	1日1回		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
内服	2	カロナール	1000 mg	ライブリバント30～60分前		●	●						●							●							●						
内服	3	レスタミンコーワ錠	30～50 mg	ライブリバント30～60分前		●	●						●							●							●						
内服	4																																
内服	5																																
放射線			Gy																														

特記事項

ライブリバント:インラインフィルター(0.2～0.22μm)を使用すること。
※Infusion reactionが認められない場合は、投与開始2時間後に投与速度をDAY1は75ml/時、DAY2は50ml/時にあげることができる。
治療開始4ヶ月間は、アピキサバン1回2.5mgを1日2回経口投与すること。

減量規定

薬品名	ラズクルーズ	ライブリバント	ライブリバント		
標準投与量	240 mg	1050 mg	1400 mg		
1段階減量	160 mg	700 mg	1050 mg		
2段階減量	80 mg	350 mg	700 mg		
3段階減量	中止	中止	中止		

(ID　1　) ☆7