治療計画書

療法名　DVRd療法　9サイクル目以降　療法　1サイクル　4　週

疾患名　造血幹細胞移植の適応とならない未治療の多発性骨髄腫（9サイクル以降）

注射 / 内服 / 放射線	Rp	商品名 / 照射部位	用量(/回) / 用量(/日) / 照射量	投与ルート / 用法	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
注射	1	ダラキューロ	1800 mg/body	皮下注		●																											
注射	2																																
注射	3																																
注射	4																																
注射	5																																
注射	6																																
注射	7																																
注射	8																																
注射	9																																
注射	10																																
内服	1	レナデックス	40 mg	ダラキューロ投与1-3時間前		●																											
内服	2	レナデックス	40 mg	1日1回									●							●							●						
内服	3	レナリドミド	25 mg	1日1回		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
内服	4	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	2 mg	ダラキューロ投与1-3時間前		●																											
内服	5	カロナール	1000 mg	ダラキューロ投与1-3時間前		●																											
内服	6																																
内服	7																																
放射線			Gy																														

特記事項

・Grade 3のインフュージョンリアクションが3回出現した場合およびGrade 4のインフュージョンリアクションが出現した場合は、ダラキューロの投与を中止する。
・75歳を超える、または過小体重（BMI：18.5kg/m2未満）の患者には、レナデックス20mg/週を投与。

減量規定

薬品名	レナリドミド				
標準投与量	25 mg				
1段階減量	20 mg				
2段階減量	15 mg				
3段階減量	10 mg				
4段階減量	5 mg				