治療計画書

療法名　アザシチジン皮下注＋ティブソボ　療法　1サイクル 4 週

疾患名　IDH1遺伝子変異陽性の急性骨髄性白血病

注射/内服/放射線	Rp	商品名	用量(/回) / 用量(/日) / 照射量	投与ルート / 用法	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
注射	1	グラニセトロン	3 mg	点滴	30分	●	●	●	●	●	●	●																					
		デキサート	6.6 mg																														
注射	2	アザシチジン	75 mg/㎡	皮下注		●	●	●	●	●	●	●																					
		注射用水	25mg/mlで溶解																														
注射	3																																
注射	4																																
注射	5																																
注射	6																																
注射	7																																
注射	8																																
注射	9																																
注射	10																																
内服	1	ティブソボ	500 mg	1日1回		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
内服	2																																
内服	3																																
内服	4																																
内服	5																																
内服	6																																
内服	7																																
内服	8																																
内服	9																																
内服	10																																
放射線			Gy																														

特記事項

ティブソボ：強いCYP3A阻害薬と併用する場合は250mgへの減量を考慮。（詳細は添付文書参考）
デカドロン内服追加やナゼア内服への切り替えも可能。

減量規定

薬品名	アザシチジン				
標準投与量	75 mg/㎡				
1段階減量	37.5 mg/㎡				
2段階減量	25 mg/㎡				
3段階減量	中止				