

EGFR遺伝子変異陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌

注射		商品名	用量(／回)	投与ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
内服	Rp		用量(／日)	用法																													
放射線		照射部位	照射量																														
注射	1	生理食塩液	50 ml	点滴	30分																												
		デキサート	6.6 mg																														
							●																										
注射	2	生理食塩液	50 ml	点滴	5分																												
							●																										
注射	3	ペムトレキシド [®]	500 mg/m ²	点滴	10分																												
		生理食塩液	100 ml																														
							●																										
注射	4	生理食塩液	50 ml	点滴	10分																												
							●																										
注射	5	ライブリバント	2100 mg	点滴	125ml/時																												
		生理食塩液	250 ml																														
			全量250mlに調製				●																										
注射	6	生理食塩液	50 ml	点滴	30分																												
							●																										
注射	7	メチコパール	1 mg	筋注		ペムトレキシド初回投与の少なくとも7日前に、ビタミンB12として1回1mgを筋肉内投与する。その後、ペムトレキシド投与期間中及び投与中止後22日目まで9週ごと(3コースごと)に1回投与する。																											
内服	1	バンビタン(葉酸0.5mg/g)	1 g	1日1回連日投与		ペムトレキシド初回投与の7日以上前から1日1回0.5mgを連日経口投与し、最終投与日から22日目まで継続																											
内服	2	カロナール	1000 mg	ライブリバント30～60分前		●																											
内服	3	レスタミンコウ錠	30～50 mg	ライブリバント30～60分前		●																											
内服	4																																
内服	5																																
放射線			Gy																														
特記事項																																	
ペムトレキシドによる重篤な副作用軽減のため葉酸およびビタミンB12を投与する(添付文書参照)。 ライブリバント：インラインフィルター(0.2～0.22μm)を使用すること。																																	
減量規定																																	
薬品名	ライブリバント																																
標準投与量	2100 mg																																
1段階減量	1750 mg																																
2段階減量	1400 mg																																
3段階減量	中止																																