(ID　0　) ☆7

治療計画書

療法名　ライブリバント（体重80kg未満）+ラズクルーズ（2サイクル目以降）　療法　1サイクル 4 週

EGFR遺伝子変異陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺がん

注射	Rp	商品名	用量(/回)	投与ルート	投与時間	1							2							3							4						
内服			用量(/日)	用法		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
放射線		照射部位	照射量																														
注射	1	生理食塩液	50 ml	点滴	15分	●														●													
注射	2	ライブリバント	1050 mg	点滴	125ml/時	●														●													
		生理食塩液	250 ml																														
			全量250mlに調製																														
注射	3	生理食塩液	50 ml	点滴	30分	●														●													
注射	4																																
注射	5																																
注射	6																																
注射	7																																
注射	8																																
注射	9																																
内服	1	ラズクルーズ	240 mg	1日1回		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
内服	2	カロナール	1000 mg	ライブリバント30～60分前		●														●													
内服	3	レスタミンコーワ錠	30～50 mg	ライブリバント30～60分前		●														●													
内服	4																																
内服	5																																
放射線			Gy																														

特記事項

ライブリバント：インラインフィルター（0.2～0.22μm）を使用すること。
治療開始4ヶ月間は、アピキサバン1回2.5mgを1日2回経口投与すること。

減量規定

薬品名	ラズクルーズ	ライブリバント			
標準投与量	240 mg	1050 mg			
1段階減量	160 mg	700 mg			
2段階減量	80 mg	350 mg			
3段階減量	中止	中止			

(ID　1　) ☆7