(ID　0　) ☆7

治療計画書

療法名　ルマケラス+ベクティビックス　療法　1サイクル 2 週

疾患名　KRAS　G12C変異陽性の治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸がん

注射 / 内服 / 放射線	Rp	商品名 / 照射部位	用量(/回) / 用量(/日) / 照射量	投与ルート / 用法	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
						1							2							3							4						
注射	1	生理食塩液	50 ml	点滴	15分	●														●													
注射	2	ベクティビックス	6 mg/kg	点滴	1時間	●														●													
		生理食塩液	100 ml	全量100mlに調製																													
注射	3	生理食塩液	50 ml	点滴	15分	●														●													
注射	4																																
注射	5																																
注射																																	
注射	7																																
注射	8																																
注射	9																																
注射	10																																
内服	1	ルマケラス	960 mg	1日1回		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
内服	2																																
内服	3																																
内服	4																																
内服	5																																
内服	6																																
内服	7																																
内服	8																																
内服	9																																
内服	10																																
放射線			Gy																														

特記事項

インラインフィルター(0.2又は0.22μm)を使用すること。
ベクティビックス初回投与前にルマケラスを投与すること。

減量規定

薬品名	ベクティビックス	ルマケラス			
標準投与量	6 mg/kg	960 mg			
1段階減量	4.8 mg/kg	480 mg			
2段階減量	3.6 mg/kg	240 mg			
3段階減量	中止				