

治療計画書

療法名 イミフィンジ+ゲムシタビン+シスプラチン(CC_r60以上)

療法 1サイクル 3 週

疾患名 膀胱がんにおける術前補助療法(4サイクルまで)

注射 内服 放射線	Rp	商品名 照射部位	用量(/回) 用量(/日)	投与ルート 用法	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				
						照射量																															
注射	1	生理食塩液	500 ml	点滴	2時間																																
注射	2	イミフィンジ	※1500 mg/body	点滴	60分																																
		生理食塩液	100 ml																																		
注射	3	生理食塩液	500 ml	点滴	2時間																																
注射	4	グラニセトロン	3 mg	点滴	30分																																
		デキサート	13.2-16.5 mg																																		
注射	5	グラニセトロン	3 mg	点滴	30分																																
注射	6	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	点滴	30分																																
		生理食塩液	100 ml																																		
注射	7	生理食塩液	50 ml	点滴	15分																																
注射	8	シスプラチン	70 mg/m ²	点滴	2時間																																
		生理食塩液	500 ml	全量500mlに調製																																	
注射	9	ビカネイト	500 ml	点滴	2時間																																
		フロセミド	10 mg																																		
注射	10	ヴィーンF	500 ml	点滴	2時間																																
注射	11																																				
内服	1	デカドロン	8 mg	1日1(-2)回朝(昼)食後		●●●●																															
内服	2																																				
放射線			Gy																																		

特記事項

※体重30kg以下の場合、イミフィンジは20mg/kgで投与。
インラインフィルター(0.2又は0.22 μm)を使用すること。

減量規定

薬品名																																			
標準投与量																																			
1段階減量																																			
2段階減量																																			
3段階減量																																			