治療計画書

療法名　DVRd療法　3-8サイクル目　療法　1サイクル 3 週

疾患名　造血幹細胞移植の適応とならない未治療の多発性骨髄腫（3-8サイクル目）

注射/内服/放射線	Rp	商品名	用量(/回) / 用量(/日) / 照射量	投与ルート / 用法	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
注射	1	ダラキューロ	1800 mg/body	皮下注		●																											
注射	2	ボルテゾミブ	1.3 mg/㎡	皮下注		●			●				●			●																	
		生理食塩液	2.5mg/mLで溶解																														
注射	3																																
注射	4																																
注射	5																																
注射	6																																
注射	7																																
注射	8																																
注射	9																																
注射	10																																
内服	1	レナデックス	20 mg	ダラキューロ投与1-3時間前		●																											
内服	2	レナデックス	20 mg	1日1回			●		●	●			●	●		●	●																
内服	3	レナリドミド	25 mg	1日1回		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●														
内服	4	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	2 mg	ダラキューロ投与1-3時間前		●																											
内服	5	カロナール	1000 mg	ダラキューロ投与1-3時間前		●																											
内服	6																																
内服	7																																
放射線			Gy																														

特記事項

・末梢神経障害で休薬後、症状が回復した場合はベルケイドを0.7mg/m2に減量し、週1回投与に変更する。
・Grade 3のインフュージョンリアクションが3回出現した場合およびGrade 4のインフュージョンリアクションが出現した場合は、ダラキューロの投与を中止する。
・75歳を超える、または過小体重（BMI:18.5kg/m2未満）の患者には、レナデックス20mgをDay1、4、8、11に減量して投与。

減量規定

薬品名	ボルテゾミブ	レナリドミド			
標準投与量	1.3 mg/㎡	25 mg			
1段階減量	1.0 mg/㎡	20 mg			
2段階減量	0.7 mg/㎡	15 mg			
3段階減量	投与中止	10 mg			
4段階減量		5 mg			