治療計画書

療法名　エプキンリ　2ステップ漸増（1サイクル目）　療法　1サイクル　4　週

再発又は難治性の大細胞型B細胞リンパ腫

疾患名　再発又は難治性の濾胞性リンパ腫Gread3B

注射 / 内服 / 放射線	Rp	商品名 / 照射部位	用量(/回) / 用量(/日) / 照射量	投与ルート / 用法	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
						1							2							3							4						
注射	1	生理食塩液	500 ml	点滴	6時間	●							●							●							●						
注射	2	デキサート	13.2 mg	点滴(側管)	15分	●	●	●	●				●	●	●	●				●	●	●	●				●	●	●	●			
		生理食塩液	50 ml																														
注射	3	エプキンリ	0.16 mg	皮下注		●																											
		生理食塩液	20 ml																														
			0.16mg/mlに調製																														
注射	4	エプキンリ	0.8 mg	皮下注									●																				
		生理食塩液	20 ml																														
			0.8mg/mlに調製																														
注射	5	エプキンリ	48 mg	皮下注																●							●						
注射	6	生理食塩液	500 ml	点滴	6時間	●							●							●							●						
注射	7	生理食塩液	500 ml	点滴	6時間	●							●							●							●						
注射	8																																
注射	9																																
注射	10																																
内服	1	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	2 mg	エプキンリ投与30分前		●							●							●							●						
内服	2	カロナール	1000 mg	エプキンリ投与30分前		●							●							●							●						
内服	3																																
内服	4																																
内服	5																																
内服	6																																
内服	7																																
内服	8																																
内服	9																																
放射線			Gy																														

特記事項

day1,8, 15, 22のデキサート19.8mgはエプキンリ投与の1時間前に静注する。
生理食塩液（1本目）は10:00から開始し、エプキンリは原則午後に皮下注する。

減量規定

薬品名					
標準投与量					
1段階減量					
2段階減量					
3段階減量					