

# 内視鏡的 胃粘膜下層剥離術を受ける患者様へ

経過 日時	検査前日 月 日	治療当日 検査前 月 日	治療当日 検査後 月 日	治療後1日 月 日	治療後2日 月 日	治療後3~4日 月 日 ~ 月 日	治療後5日 月 日
治療処置	治療の時に履く 弾性ストッキングのサイズを 測います ※下肢深部静脈の 血流を促進し 血栓予防を図ります	治療前に弾性ストッキングを 履きます 午前中に右手から 点滴を開始します 	帰室後2時間は酸素吸入と 心電図モニターを装着します 午前中より開始した点滴は あわせて4本あります 	朝に胃カメラが あります  点滴が2本あります	点滴が1本あります ※点滴は食事量・発熱の状況に応じて変わることがあります		
食事	普通食です (患者様によって治療食 の場合があります)  21時からは絶食です 水やお茶は飲めます 	前日より絶食中です 12時以降は水分も禁止に なりません 	絶食中です 水分も飲むことが出来ません ※翌日の胃カメラの結果が 出るまで飲食はできません 	胃カメラ終了後1時間が 経過したら飲水できます 時間は看護師がお伝え します 夕食から潰瘍食3分粥 が開始になります 	潰瘍食3分粥  間食はしないでください	潰瘍食5分粥 	潰瘍食全粥 
内服薬	中止している薬以外は いつも通り内服して ください	朝6時頃、指示があった薬を 内服してください	内服薬は中止です 	新しい内服薬が開始になります 常用薬も内服再開です 中止薬がある場合は指定の日から内服再開してください 			
清潔	入浴できます 	点滴開始前に入浴できます	入浴できません 	シャワー浴可です 	入浴できます 		
安静	制限はありません	検査前は制限はありません 点滴しながら歩行できます	治療後2時間は ベッド上安静です それ以降は トイレ・洗面所まで 移動できます 	制限はありません 			
ご説明指導	入院生活・治療について 看護師から 説明があります 	検査の前に入歯・金属類を 外します トイレも済ませてください 貴重品はご家族に預けて ください 	弾性ストッキングは安静が 解除になったら脱ぐことが できます 黒い便や暗赤色の便の時はお知らせください		栄養士から食事指導があります 薬剤師から服薬指導があります 		