



内視鏡的大腸ポリープ切除術を受けられる方へ

差額ベッド(2人部屋)1260円(可・不可) 氏名

様

外来	入院前日(/)	入院当日(/)			入院1日目(/)	退院後～受診日までの生活上注意点
		術前	術直前～術中	術後		
<p>(/)</p> <p>総合案内で受付後、1階消化器内科外来へお越し下さい。以下の検査を行います。</p> <p>□胸部レントゲン □心電図 □採血</p> <p>検査後、医師の診察があります。</p> <p>血液をサラサラにする薬を内服している方は、中止する必要があります。</p> <p>薬剤名 ()</p> <p>中止日 (/)～</p> <p>入院当日持参するもの</p> <p>①現在内服中の薬があれば、お薬手帳と一緒に持参下さい。</p> <p>②承諾書</p> <p>③入院願い</p> <p>④病状説明に関する質問用紙(②③④は記入しご持参下さい)</p> <p>⑤おはし・スプーン・湯飲み茶碗</p> <p>⑥スリッパ</p> 	<p>食事</p> <p>1日三食(朝、昼、晩)、消化の良いものを食べてください。(別紙を参照下さい)</p> <p>以下のものは避けてください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・海藻類(ワカメ・ひじき・のり等) ・糸こんにゃく、しらたき ・山菜類(きのこ・たけのこ等) ・種のあるもの(ごま・イチゴ・キウイ等) <p>夜7時以降は食べないで下さい。水・お茶などの水分類は飲んでかまいません。</p>	<p>入院当日は朝8:30までに総合案内にお越し下さい。</p> <p>□朝から絶食です。</p> <p>□水分(お茶・水)は昼12時までではとることができますが、下剤内服中は下剤のみにしていただいた方が効果があります。</p>	<p>処置は1階の内視鏡室で行います。</p> <p>昼2～4時に予定しています。</p> <p>□看護師が排便性状を確認した後に検査用パンツに着替えて頂きます。</p>	<p>夕食(6時)から飲食出来ません。それまで間食は控えてください(お粥食)</p> <p>お腹が張っていたり、痛みがある場合、水分以外は飲食はできません。症状が落ち着いてから飲食することができます。</p> 	<p>朝食(7時30分)(お粥食)</p>	<p>普段どおりの食事で良いですが、出血・腹痛の原因になるため治療後10日間は※刺激物・消化の悪い食べ物は避けて下さい。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・海草類(ワカメ・ひじき・のりなど…) ・山菜類(キノコ・たけのこなど…) ・辛い・しょっぱい物 <p>※必ず禁酒をして下さい。</p>
	<p>内服</p> <p>通常どおり内服して下さい。</p>	<p>□血圧、心臓、精神科の薬を内服中の方は朝6時に内服して下さい。血糖値を下げる薬を内服されている方は医師の指示があるまで内服を中止して下さい。</p>	<p>□手術に行く前に止血剤入りの点滴を行います。点滴をしたまま手術に行きます。</p> <p>□着替えの下着を内視鏡室にご持参下さい。</p> <p>□お化粧品は必ず落として下さい。</p> <p>□時計・指輪・眼鏡・入れ歯・ヘアピン等の取り外しの出来る金属類は外して下さい。</p>	<p>□医師・看護師の指示どおり内服していただきます。</p>	<p>□医師・看護師の指示どおり内服していただきます。</p>	<p>医師・看護師の指示どおり内服して下さい。</p> <p>中止薬のある場合は医師が指示した日から再開下さい。</p> <p>薬剤名 ()</p> <p>再開日 (/)～</p>
	<p>検査・処置</p> <p>□夜9時頃に下剤(ピコスルファートナトリウム)をコップ1杯の水に入れて内服して下さい。</p> 	<p>□身長・体重測定</p> <p>□下剤1800mlを2時間かけて飲みます。(紙コップ1杯=15分)</p>	<p>下剤を内服すると徐々に便が水様便になります。</p> <p>□昼12時頃、便の状態を観察に伺います。排便後流さず、トイレ内の呼び出しボタンを押してお知らせ下さい。便の出が悪いときは洗腸が必要になります。</p>	<p>□止血剤の点滴が終了次第、点滴を抜きます。</p> <p>□時計・指輪・眼鏡・入れ歯・ヘアピン等の取り外しの出来る金属類は外して下さい。</p> <p>□小さい荷物がありましたら、貴重品等は内視鏡室に持参出来ます。</p>	<p>□退院前に医師が病室に診察に伺います。診察の結果、退院の許可が出ます。</p>	<p>約10日後以降に外来受診日を決めます。</p> <p>外来で病理検査の結果を説明します。</p>
	<p>排泄</p> 	<p>行動制限はありません。入浴は出来ます。</p>	<p>下剤の効果を出すため、内服中は散歩して下さい。</p> 	<p>□出血がないか切除後の排便は確認する必要があります。排便後は流さずに呼び出しボタンを押してお知らせ下さい。</p>	<p>退院時は、</p> <ul style="list-style-type: none"> ・会計書がクラークより渡されます。 ・次回予約票 ・診察券 ・退院療養計画書を看護師が渡します。全てそろったら退院となります。 	<p>便に血液が混じる、激しい腹痛・長く続く腹痛がある場合は受診して下さい。</p> 
<p>安静・清潔</p>	<p>下剤の効果を出すため、内服中は散歩して下さい。</p>	<p>下剤の効果を出すため、内服中は散歩して下さい。</p>	<p>□出血予防・傷口の安静の為、点滴施行中はトイレ・洗面所以外はベッドで安静にしてお過ごし下さい。入浴はできません。</p>	<p>出血がなければ入浴出来ます。</p>	<p>治療後10日間は激しい運動、重い物を持ったりなどの腹部に力が入る動作は避けて下さい。</p>	

患者目標：治療の必要性を理解している。
下剤以外の禁飲食が守られる。

市立秋田総合病院 8階北病棟 消化器内科外来
お問い合わせ：市立秋田総合病院 消化器内科・代謝科 TEL018-823-4171