








# 経カテーテル的肝動脈塞栓療法を受ける患者様へ

経過 日時	検査前日 月 日	治療当日 検査前 月 日	治療当日 検査後 月 日	治療後1日 月 日	治療後2日 月 日	治療後3日 月 日	治療後4日以降 月 日 ~	
治療 処置	<ul style="list-style-type: none"> <li>治療の時に履く弾性ストッキングのサイズを測います ※ 下肢深部静脈の血流を促進し血栓予防を図ります</li> <li>ミギ鼠径部の除毛をします</li> <li>足背動脈に印をつけます</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>治療前にガウンに着替えます</li> <li>8:30頃点滴をします</li> <li>前投薬内服します 早朝から点滴を開始する場合があります)</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>鼠径部の針を抜いた部分をバンドやテープで圧迫固定します</li> <li>弾性ストッキングを履きます</li> <li>抗生剤の点滴も行います</li> <li>帰室後4時間は心電図モニターを装着します</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>午前中に鼠径部の圧迫を外します</li> </ul>	※ 点滴は食事量・発熱の状況に応じて変わることがあります			<ul style="list-style-type: none"> <li>治療後4日目以降CTを行います</li> <li>CTの結果で退院日が決まります</li> </ul>
食事	治療食です 21時からは絶食です 水やお茶は飲めます 	前日より絶食中です ・水分は可です 	帰室後から水分を飲むことができます 夕方から食事が出ます	治療食です 				
内服薬	中止している薬以外はいつも通り内服してください 	朝6時頃、指示があった薬を内服してください 治療直前に鎮静剤を内服します	お薬は夕方から再開します 中止薬がある場合は指定の日から内服再開してください 					
清潔	入浴できます 	入浴できません 	入浴できません 	入浴できません 	シャワー浴可です (体温37.5℃以下)	入浴できます (体温37.5℃以下) 		
排泄	トイレ使用可です 	検査室へ移動前に尿道にチューブを入れます	尿道にチューブが入っています	尿道のチューブを抜きます トイレ使用可です 				
安静	制限はありません アメニティ契約のないかたはバスタオル2枚と吸い飲みまたはストローを準備してください	<ul style="list-style-type: none"> <li>検査前は制限はありません</li> <li>検査室へはストレッチャーで移動します</li> <li>治療後は治療後4時間まで床上安静です 体制を自分で変えないでください</li> <li>安静時間は治療内容によって変更になる場合があります</li> <li>帰室後看護師から説明があります</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>床上安静ですが、朝食は床上で起き上がって食べることが出来ます</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>鼠径部の圧迫を外した後は制限はありません</li> </ul> 				
ご説明 指導	入院生活と治療について看護師から説明があります 	<ul style="list-style-type: none"> <li>検査室に移動の前にトイレを済ませましょう</li> <li>貴重品はご家族に預けてください</li> <li>治療後の安静を守りましょう</li> <li>発熱や吐き気、腹痛などが起きた場合は看護師に知らせてください</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>弾性ストッキングは歩行が開始になってから脱ぐことができます</li> <li>症状に合わせて解熱剤や鎮痛剤を使用します</li> </ul>					